

LES CONSEILS

Au jardin en SEPTEMBRE

Le Goût de la Diversité

Au mois de septembre, continuez à semer des laitues d'hiver et faites vos derniers semis de mâche. Au jardin d'ornement, semez pois de senteur et centaurée pour une floraison l'année prochaine.

SEMIS

Aromatiques

Cerfeuil commun, Ciboule de Chine, Estragon, Moutardes de Chine.

Potager

Oignons, Epinards, Rumex (Epinard Eternel), Navet, Enothère (Onagre).

Salades: Laitues pommées d'hiver, Mâche, Roquette.

Engrais verts

Luzerne, Moutarde Blanche, Trèfle Blanc, Trèfle Incarnat, Triticale, Vesce de Cerdagne.

Fleurs

Fleurs comestibles: Souci.

Fleurs : Centaurée Barbeau, Coquelicot sauvage, Pois de senteur.

Réussir la culture du navet

Le navet, simple à cultiver, est pourtant souvent absent des potagers familiaux. Comme bon nombre de légumes racines, parfois injustement oubliés, il demande à être redécouvert. Et c'est une grande et belle famille qui se révèle alors au jardinier amateur! Outre les classiques navets ronds à la robe violette, l'espèce comprend des variétés aux formes, aux couleurs et aux goûts véritablement variés.

Climat: Le navet apprécie un climat tempéré, doux et humide.

Exposition: Le navet aime les expositions ensoleillées.

Sol: Humifère, meuble et frais.

Semis

Semer clair en place, de mars à juin pour les variétés d'été et de mi-juillet à mi-août pour les variétés d'automne et d'hiver. Plomber les semis avec le dos d'un râteau.

Espacement

Semer en lignes distantes de 25 à 30 cm. Prévoir d'éclaircir lorsque les plants ont 2 ou 3 feuilles.

Récolte

Les navets se récoltent 2 mois après le semis dans le cas d'un semis de printemps et d'automne ; 3 mois après le semis dans le cas des variétés d'hiver.

Bons mariages

Le navet apprécie la proximité de l'aneth, de la menthe, du romarin et du céleri, il se plaît aussi au côté de la carotte, du haricot, de la laitue, de la tomate et du pois.

Fertilisation

Les navets apprécient d'être cultivés dans des sols ayant reçus une fertilisation classique à l'automne ou au tout début du printemps. Des apports de compost bien décomposé durant la culture sont très profitables aux navets.

Entretien

Binages et sarclages sont de rigueur. Pensez aussi à un arrosage régulier, les navets n'appréciant pas la sécheresse.

Maladies et parasites

En cas d'attaque par l'altise, les feuilles des navets se retrouvent perforées en de multiples endroits. Il est aisé de prévenir les dégâts de cet insecte, qui peut proliférer en période de sécheresse, en les repoussant grâce aux bons mariages avec des plantes aromatiques.

La limace est une grande dévoreuse des jeunes plants. Afin qu'elle ne ruine pas vos cultures de navets, disposez des Pièges Anti-Limaces autour de vos plants.

La mouche du navet peut grandement nuire aux racines, ses larves mineuses creusant celles-ci de multiples boyaux. En curatif il convient de détruire les pieds attaqués et de mettre en place une longue rotation dans la culture. En préventif pensez à maintenir le sol humide et à éviter les fumures fraîches. Il est aussi possible de repousser la mouche du navet en disposant entre les rangs de navets des branches de plantes aromatiques comme le thym, le romarin, la mélisse ou l'hysope.

Le mildiou est la maladie la plus courante pour le navet. Il se reconnaît par le jaunissement des feuilles puis par les taches d'un blanc duveteux qu'elles revêtent. Il convient alors de détruire les plants atteints. En prévention pulvériser sur le sol de la Tisane de Prêle et traiter à la Bouillie bordelaise.

La hernie du navet est une maladie fongique qui atteint parfois les racines qui s'en trouvent déformées. Il convient d'éviter les fumures fraîches pour éviter cet aléa. Des températures diurnes entre 19,5 et 23,5 °C, une humidité du sol élevée ainsi qu'un sol acide sont des conditions qui favorisent l'infection et le développement de la maladie. En curatif, comme pour la mouche du navet, il convient de détruire les pieds attaqués et de mettre en place une longue rotation dans la culture.

La chenille verte, dite piéride du chou, est une terrible défoliatrice. En prévention pensez à disposer au sol des feuilles de fougères.

Le silphe opale, petite larve noire d'un cm de long, peux parfois s'attaquer aux jeunes plants. La tenthrède, sorte de petite chenille de couleur sombre, s'attaque quant à elles aux feuilles des navets, allant jusqu'à les faire complètement dépérir.

On peut lutter contre ces deux ravageurs par un traitement à base d'Insecticide biologique.

Rotation des cultures

Le navet est considéré comme une plante épuisante pour le sol. Il convient donc de ne pas le faire revenir au même endroit avant 3 ou 4 ans.

Astuces

Les jeunes feuilles de navet, fraîchement démarrées, sont un vrai régal tombées au beurre ou sautées « à l'italienne » !

Réussir la culture de la courge et de la courgette Les courges et courgettes sont des légumes productifs, faciles de culture et d'entretien. Il existe de nombreuses variétés de courges dont les types les plus courants sont :

- Potirons à gros fruits ronds et plats de 5 à 10 kg, rouges, bruns ou jaunes,
- Potimarrons: fruits ronds orange de 1,5 à 3 kg,
- Sucrines : fruits orange en forme de poire de 2 à 3 kg,
- Pâtissons blancs ou orange : petits fruits de 1 à 1,5 kg,
- Courges ornementales non-comestibles : Coloquintes et Halloween.

On distingue des courgettes:

- de forme longue ou ronde
- de couleur verte ou jaune.

Climat : Chaud et tempéré

Exposition: Ensoleillée

Sol : Humifère, meuble, frais et léger

Semis: En avril en godets.

Plantation: Quand les gelées ne sont plus à craindre, repiquer les plants en place.

Espacement

Les plants doivent être repiqués à 1 m en tous sens pour les variétés non coureuses. Les variétés coureuses sont quant à elles repiquées tous les 1,20 m avec 2 m entre les rangs.

Récolte

De 2 mois après le semis pour les variétés types courgettes, à 3-4 mois après le semis pour les variétés de conservation.

Bons mariages

Eviter de la faire voisiner avec les pommes de terre. Par contre, elle apprécie la proximité du haricot et du chou.

Fertilisation

Veiller à ne pas apporter trop d'engrais azoté à la plantation. Par contre, n'hésitez pas à faire de copieux apports en compost au moment du repiquage des plants à leur place définitive.

Entretien: Binage et sarclage sont de rigueur. Pailler et arroser régulièrement mais sans excès.

Taille

Les courges coureuses peuvent être taillées, lorsque les plants comportent 4 ou 5 feuilles, en pinçant au-dessus de la 2ème feuille. Par la suite il suffira de pincer la tige à 2 feuilles au-dessus de chaque fruit et de supprimer les jeunes pousses. De cette façon vous pouvez ne garder que 2 à 3 gros fruits par pied ou 5 à 6 petits fruits par pied.

Maladies et parasites

L'Oïdium apparaît assez souvent en fin de culture estivale. Sa présence ne met pas vraiment la

culture en péril et il n'est pas forcément nécessaire de le traiter. En préventif, un traitement au purin d'ortie est une bonne solution.

Le puceron noir s'attaque parfois feuilles dont il suce la sève. Le puceron des racines s'attaque quant à lui au collet des plantes. En curatif, effectuer des pulvérisations d'insecticide Anti-Puceron à base de Pyrèthre à la rosée du soir.

Rotation des cultures

Les courges et courgettes sont peu exigeantes et peuvent donc revenir au même emplacement au bout de 2-3 ans.

Réussir la culture de la roquette

La roquette est une plante annuelle de la famille des Brassicacées (ou Crucifères), à fleurs blanches ou jaunâtres veinées de brun ou de violet, dont les feuilles ressemblent à celles des radis et des navets (botaniquement très proches) et ont une saveur piquante et poivrée. Les feuilles s'utilisent crues en salade ou cuites avec des pâtes ou en pizzas.

Climat: La roquette aime les climats tempérés et pas trop chauds.

Exposition: Ensoleillée sauf en été.

Sol: Relativement riche, maintenus frais.

Semis : En place, de mars à mai et de mi-août à mi-septembre.

Espacement: 1m sur le rang et 14,50 m.

Récolte

La récolte des jeunes pousses de récolte est conseillée le matin, par temps frais pour favoriser leur conservation. La section à ras des pousses de roquette stimule la repousse de deux ou trois rameaux.

Bons mariages : Avec la carotte pour laquelle elle trace la ligne et la tomate qui la protège de l'altise.

Fertilisation: Apport de compost avant le semis de printemps.

Entretien

Les sarclages permettent d'éviter le développement de mauvaises herbes, gênantes lors de la récolte. Essayer aussi de maintenir la culture fraîche. Eclaireir en ne gardant qu'un jeune plant par contenant.

Maladies et parasites

Les altises, puces de jardin abondantes par temps chauds, sont responsables d'une multitude trous sur les feuilles. Pour lutter, réalisez un bassinage régulier, posez un filet anti-insectes ou encore disposez du purin ou des plantes odorantes.

Astuce : La roquette n'aime pas la chaleur, il est déconseillé de la cultiver en saison estivale.

Réussir la culture de l'onagre

Sol: léger, drainé, assez pauvre et calcaire.

Expo

Exposition: ensoleillée.

Semis

En place, en avril et septembre-octobre, lorsque la température extérieure est proche de $20\,^{\circ}$ C, à $2\,\mathrm{cm}$ de profondeur.

Espacement: 20 à 25 cm sur le rang et entre les rangs.

Récolte

Récolter les tiges de préférence avant la montée à graines car l'onagre peut devenir envahissante.

Entretien : Sarcler régulièrement et arroser de temps en temps la première année.

Réussir la culture de la coriandre

La coriandre est une Apiacées dont le nom vient du grec *koris* qui signifie "punaise" du fait de l'odeur qui se dégage quand on froisse les feuilles. On en utilise actuellement aussi bien les graines que les feuilles en fonction des idées et des envies de chacun.

Sol : Léger et meuble.

Exposition: ensoleillée mais abritée.

Semis

En place, d'avril à septembre, en poquets de 4 ou 5 graines. Conseil : faire tremper les graines 12h avant le semis.

Espacement: 20 cm sur le rang et 30 cm entre les rangs.

Récolte

40 jours pour les feuilles à 150 jours après le semis pour les graines. Cueillez les feuilles régulièrement car la montée à graines est très rapide.

Entretien

Désherber et maintenir le sol frais. Le cycle de la coriandre est très rapide. Couper les fleurs ne sert pas à grand-chose, il vaut mieux ressemer sur place et récolter des graines. Pour une récolte régulière du feuillage, semer toutes les 3 semaines.

Les ennemis : Elle ne semble rien redouter.

Réussir la culture de Sol: bien drainé voire caillouteux.

l'estragon

Exposition: ensoleillée.

Semis: en place, en avril-mai, de 1 à 2 cm de profondeur.

Espacement: 20 cm entre les rangs

Récolte

Les tiges sont récoltées au fur et à mesure des besoins. Récoltez en premier les tiges les plus anciennes. Il vaut mieux cueillir les tiges une par une que d'arracher les feuilles.

Entretien

L'estragon supporte très mal le froid. Durant la saison froide, le pailler, et le protéger du froid le plus possible. Le mieux consiste à la conserver en intérieur à cette période. Pincer les jeunes plants stimule la ramification pour une meilleure production.

Les ennemis

L'estragon risque fortement de pourrir sur un sol détrempé et en atmosphère humide.

Source : GNIS